

Aktuelle Studien im Venenzentrum, Stand 08.07.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Interesse an den Studien unseres Zentrums. Derzeit sind bei uns folgende Studien aktiv, für die wir geeignete Patienten suchen. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei unserem Studienteam. Dort werden Sie weitere Informationen erhalten.

- Tel. 0234-8792-274
- Mail. Team-phlebo@klinikum-bochum.de

Kurztitel der Studie	Einsatzgebiet	Eckdaten
Eurocom KKL1	Kompressionstherapie bei Patienten mit unkomplizierter Varikosis mittels Kompressionsstrümpfen der Klasse 1	<ul style="list-style-type: none">• Prospektiv, randomisierte, kontrollierte, nicht verblindete Studie• Studie an 2 Studienzentren, insgesamt 154 Patienten• Patienten mit duplexsonographisch gesicherter Veneninsuffizienz (Symptome und sichtbare Krampfadern)• 2 Behandlungsgruppen• Studiendauer max. 32 Tage, 3 Studienvisiten• Patienten führen ein elektronisches Beschwerdetagebuch (APP)
Rheacell autolog/allogen	Patienten mit einer schwer heilenden venös bedingten Beinwunde, sog. Ulcus cruris venosum	<ul style="list-style-type: none">• klinische Prüfung der Phase I/IIa zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von aus der Haut gewonnenen Stammzellen auf die Wundheilung von chronischen venösen Ulcera (CVU)• zwei Studientypen: Stammzellen aus eigenem Gewebe des Patienten oder von einem fremden, gesunden Spender• 3 Zentren in Deutschland• Keine Randomisierung = alle Patienten bekommen eine Therapie• Beobachtungszeit pro Patient bis 19 Monate• Durch das Studienprotokoll vorgeschriebene Visiten und Blutentnahmen• Je nach Studientyp auch Entnahme von Eigenhaut

MediAdipositas	Kompressionstherapie bei Patienten mit Adipositas-assoziiierter funktioneller chronischer venöser Insuffizienz	<ul style="list-style-type: none"> • Prospektive, offene, kontrollierte Studie nur in Bochum, mit insgesamt 50 Patienten • Pilotprojekt Behandlungsdauer 5 Wochen mit 4 Visiten • Beschwerdetagebuch führen
FlowAid	Pilotstudie zum Einsatz einer neuromuskulären Stimulation (FlowAid) bei Patienten mit therapieresistentem Ulcus cruris venosum	<ul style="list-style-type: none"> • Prospektive, offene, kontrollierte Studie nur in Bochum, mit insgesamt 20 Patienten • Behandlungsdauer 5 Wochen mit 4 Visiten
Air- VFT	Vergleich zweier Messverfahren in der Diagnostik von venösen Erkrankungen	<ul style="list-style-type: none"> • Prospektive, kontrollierte Pilotstudie nur in Bochum • Vergleich von standardisierter digitaler Photoplethysmographie (DPPG) mit Air-VFT • Alle Patienten erhalten 2 Messungen an einem Tag • Insgesamt sollen 50 Patienten eingeschlossen werden

Studienstart in Kürze

Kurztitel	Einsatzgebiet	Eckdaten	Geplanter Start
Kinesiotape	Sicherheit und Effektivität von Kinesiotape unter konventioneller Kompressionstherapie bei Patienten nach einer beidseitigen Operation an der V. saphena magna oder V. saphena parva mit Entfernung von Seitenastkrampfadern	<ul style="list-style-type: none"> • Prospektive, kontrollierte Studie nur in Bochum, mit insgesamt 44 Patienten • Behandlungsdauer 8 Tage mit 3 Visiten 	2019